

Benvenuti al

Elipse™

Program

Nessun intervento chirurgico,
nessuna endoscopia*,
nessuna anestesia
Solo risultati**

*In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere necessario ricorrere a procedure endoscopiche o chirurgiche.

**I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.

Il presente materiale non è destinato al pubblico statunitense. Il presente materiale descrive un nostro prodotto, non approvato né autorizzato per l'immissione sul mercato da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Il nostro prodotto non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti.

DCO1240

Rev 1



 allurion


APM119-03

Prima di cominciare...




01 Quali soluzioni per la perdita di peso hai provato in precedenza?

02 Qual è l'obiettivo di perdita di peso che vorresti raggiungere con il programma Elipse?



Non sei solo

Sovrappeso e obesità
Un'epidemia globale



1 su 3

3


persone sono in sovrappeso o obese in Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Cina ed EAU*

Gli effetti dell'obesità sono multidimensionali

Il peso in eccesso ha un impatto profondo sulla salute, non solo sull'aspetto e sulle sensazioni che provi



COMPLICANZE CORRELATE ALL' OBESITA'




4

1. The health effects of overweight and obesity <https://www.cdc.gov/healthyweight/effects/index.html>. Ultimo accesso 7 aprile 2019

Provi un senso di frustrazione nei confronti dei programmi per la perdita di peso?

In base a una ricerca di mercato condotta da Allurion, la maggior parte delle opzioni di trattamento disponibili non soddisfa le aspettative

SODDISFAZIONE NEI CONFRONTI DELLE SOLUZIONI PER LA PERDITA DI PESO (WL)
Valutata su una scala da 1-10 – da coloro che hanno fatto ricorso a



D10. Che cosa cerchi in un trattamento per la perdita di peso eseguito da un medico / operatore sanitario? Dati globali. Base: n=2461. Probabilmente chiederebbe a un HCP una soluzione che non ha ancora provato.



|| 76%

non è pienamente
soddisfatto delle
soluzioni per la perdita
di peso già provate

Ricerca di mercato sui consumatori Allurion; 9.800 intervistati; 8 aree geografiche; Ott 2018
D3C. In base a una scala da 1 a 10, dove 1 indica assolutamente insoddisfatto e 10 estremamente soddisfatto, quanto ti ritieni soddisfatto di quanto segue? Pensa all'esperienza che hai avuto con l'intera procedura. Livello globale. Base: n=4831
Soddisfatto: 8-10/10, Né l'uno né l'altro 4-7/10, Insoddisfatto 1-3/10

Presentazione del programma Elipse

Un programma completamente supportato pensato per te



Nessuna
chirurgia

Nessuna
endoscopia*

Nessuna
anestesia

*In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere necessario ricorrere a tecniche endoscopiche o chirurgiche

Rev 1

Che cosa fa?

Il programma per la perdita di peso Elipse ha dimostrato tutta l'efficacia e la praticità di un posizionamento eseguito nel corso di una seduta ambulatoriale



Dopo circa 16 settimane di trattamento con Elipse, i pazienti hanno perso in media da **10 a 15 kg** e il **10-15%** del proprio peso corporeo^{da 1 a 10}

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.


APM119-03



Ottieni un supporto multidisciplinare durante il tuo percorso di perdita di peso^{*}

7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
8. Genco et al. Submitted to SOARD. Abstract A185, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San Francisco, United States

DCO1240



Scopri la sua semplicità innovativa: niente chirurgia, niente endoscopia, niente anestesia^{**}


*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.

**In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere necessario ricorrere a tecniche endoscopiche o chirurgiche.

Rev 1

In che modo?

I palloncini gastrici inducono una perdita di peso aumentando il senso di sazietà (pienezza), ritardando lo svuotamento gastrico e riducendo la quantità di cibo consumata a ogni pasto¹



20 min

L'esperienza del palloncino Eclipse richiede un posizionamento eseguito durante una breve seduta ambulatoriale di soli 20 minuti²

In che modo?


I palloncini gastrici offrono una cosiddetta mancanza di appetito¹



01

Ingerirai una capsula contenente il palloncino collegato a un sottile tubicino

Sarai sottoposto ad una radiografia per avere la certezza che la capsula sia nella posizione corretta




02

Il medico si servirà del sondino per riempire di liquido il palloncino inserito nello stomaco

Farai una seconda radiografia per confermare il riempimento del palloncino. Il medico in seguito rimuoverà delicatamente il sondino e potrai fare ritorno a casa

Con il palloncino posizionato nello stomaco puoi mangiare meno senza avvertire il senso di fame



03

Dopo circa 16 settimane, la valvola temporizzata del palloncino si apre e il palloncino si svuota e viene espulso spontaneamente^{2*}


1. Citazione da Lucy Jones, dietista
<http://www.lucyjonesdietitian.co.uk/>

2. Jamal et al. *Obes Surg.* 2019 Apr;29(4):1236-1241

*In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere necessario ricorrere a procedure endoscopiche o chirurgiche. Si consiglia di rivolgersi al medico per sapere se il programma Elipse è indicato per il proprio caso specifico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.allurion.com.

Come funziona il palloncino Elipse?

Occupando spazio all'interno dello stomaco, il palloncino permette di ottenere una perdita di peso aumentando il senso di sazietà (pienezza), ritardando lo svuotamento gastrico e riducendo la quantità di cibo consumata a ogni pasto¹



- Ci si sente soddisfatti prima → Porzioni più piccole
- Crea un senso di pienezza → Riduzione della voglia di cibo
- Il cibo resta più a lungo nello stomaco → Riduzione degli spuntini

Quanto peso ti aspetti di perdere?




16 settimane

Dopo circa **16 settimane** di trattamento con Elipse, i pazienti hanno perso in media da **10 a 15 kg**^{da 1 a 10}



-15%

o circa il **10-15%** del proprio peso corporeo totale^{da 1 a 10}



15k+

Palloncini Elipse sono già stati distribuiti per aiutare i pazienti di Europa e Medio Oriente a raggiungere un peso più salutare^{**}

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
8. Genco et al. Submitted to SOARD. Abstract A185, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San Francisco, United States

*A partire da settembre 2019
**Risultati possono variare da paziente a paziente.
Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.

Palloncino temporaneo non è sinonimo di dimagrimento temporaneo

Perdi peso e tienilo lontano



72%

della perdita di peso media è stato mantenuto a


12 Mesi di follow-up

Uno studio clinico con 95 pazienti ha dimostrato che il 72% della perdita di peso media ottenuta con Elipse può essere mantenuto al follow-up a 12 mesi¹


12

Cambiamento dello stile di vita

Associato a una modifica intensiva dello stile di vita in 16 settimane, Elipse permette di raggiungere una significativa perdita di peso rispetto a quanto ottenuto con la sola modifica dello stile di vita^{1*}



PERCENTUALE DI PAZIENTI CHE CONSEGUONO UN TBWL DEL 10% A 16 SETTIMANE



Una modifica intensiva dello stile di vita include un programma strutturato, nutrizionale, comportamentale e di esercizio fisico

13

1. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San Francisco, United States.

*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.

Supporto da parte di esperti

Il palloncino Elipse rappresenta l'elemento centrale di un programma multidisciplinare per la perdita di peso



Supervisione da parte
del tuo medico



6 mesi di coaching
nutrizionale da parte
di un nutrizionista
esperto*



Connessione alla
bilancia "intelligente"
e a un'applicazione
sul cellulare per
monitorare i progressi
ottenuti

*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al

Dieci passi verso il successo

Elipse è un programma di gestione dello stile di vita completamente supportato

Piano di 6 mesi**



*I risultati possono variare da paziente a paziente.

Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.

**Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi.

La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
8. Genco et al. Submitted to SOARD. Abstract A185, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San Francisco, United States.


Il programma Elipse

Un pacchetto completo per la perdita di peso




Mantieni alta la tua motivazione monitorando ogni settimana i tuoi progressi

APM119-03



Registra i tuoi dati in tempo reale con l'esclusiva bilancia wireless e la pratica app: Indice di massa corporea (BMI), peso, grasso corporeo e altri parametri ancora

DCO1240



Mostra i tuoi progressi al tuo medico, alla tua famiglia e ai tuoi amici

Rev 1

Che cosa chiedono i pazienti?

**Desideri rivolgere
domande specifiche
a questo punto?**


Quanto è diffuso l'uso del palloncino Elipse?

- Il palloncino Elipse è stato ampiamente testato e numerosi studi clinici ne dimostrano la sicurezza ^{1 a 10}
- Nell'Unione Europea è utilizzato dal 2015



100+

Utilizzato in più di 100 centri specializzati nella perdita di peso di Europa e Medio Oriente*



15k+

palloncini distribuiti in tutto il mondo*

A differenza degli altri palloncini gastrici, Elipse è l'unico a non richiedere nessuna procedura medica invasiva**



*A settembre 2019

**In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere necessario ricorrere a tecniche endoscopiche o chirurgiche.

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241

2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.

3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.

4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.

5. Genco et al. Obes Surg 2017, DOI 10.1007/s11695-017-2877-1


6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA

8. Genco et al. Submitted to SOARD. Abstract A185, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA

9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain

10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San Francisco, United States




Profilo di sicurezza di Elipse

Dati di vigilanza interni di Allurion

≈ 98%

Nessun evento avverso riferito



PERCENTUALI DI EVENTI AVVERSI (%)
MARZO 2016 – GIUGNO 2019

Unità vendute totali = 15.200

Gli eventi avversi totali segnalati sono stati meno del 2% dei palloncini Elipse posizionati totali

I 10 tipi più rilevanti

Sgonfiaggio prematuro 0,43%

Intolleranza 0,25%

Ostruzione dell'intestino tenue 0,11%

Gonfiaggio eccessivo 0,05%

Disfagia 0,05%

Ostruzione gastrica 0,03%

Perforazione gastrica 0,02%

Svuotamento incompleto del dispositivo 0,02%

Pancreatite 0,01%

Gastroparesi 0,01%


20

In rari casi, il palloncino Elipse può richiedere procedure endoscopiche o chirurgiche per la rimozione. Alcuni soggetti potrebbero non essere indicati al trattamento con il palloncino Elipse. Il medico sottoporrà il paziente a una visita medica con anamnesi dettagliata al fine di verificarne l'idoneità. Il palloncino Elipse è un ausilio temporaneo per la perdita di peso, destinato a soggetti adulti di età superiore a 18 anni, in condizione di sovrappeso o obesità definita da un indice di massa corporea (BMI) ≥ 27 . Il palloncino Elipse può essere inserito esclusivamente da un professionista medico-sanitario a conoscenza delle tecniche di utilizzo del palloncino Elipse.

Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.

In casi rari, è possibile che il palloncino vuoto, anziché passare attraverso il tratto gastrointestinale, venga espulso con il vomito. Pur essendo un evento sorprendente per il paziente, l'espulsione del palloncino con il vomito non è stata sinora associata ad alcuna segnalazione di eventi avversi.

Cosa accade se non riesco a ingerire la capsula?



- La maggior parte dei pazienti è in grado di ingerire la capsula¹
- È possibile ricorrere all'ingestione assistita:
- In caso di difficoltà a ingerire autonomamente la capsula contenente il palloncino, il tuo medico potrà assisterti irrigidendo delicatamente il catetere mediante l'inserimento di un sottile filo metallico

In un recente studio clinico di 1623 pazienti²

Il 99,9% di essi è stato in grado di deglutire il dispositivo con solo il 32% che ha necessitato dell'assistenza dello stiletto

Per quanto tempo rimane posizionato il palloncino?

Dopo circa

16 settimane

la valvola di rilascio temporizzata del palloncino sgonfierà automaticamente il palloncino. Successivamente si autoeliminerà e verrà espulso con le feci^{1*}

In uno studio

45%


dei pazienti non si è accorto dell'espulsione del palloncino¹

*In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere necessario ricorrere a procedure endoscopiche o chirurgiche. Si consiglia di rivolgersi al medico per sapere se il programma Elipse è indicato per il proprio caso specifico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.allurion.com.


1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241



Perdita di peso conseguita con i palloncini gastrici



CURVA DELLA PERDITA DI PESO DOPO IL POSIZIONAMENTO DEL PALLONCINO ORBERA¹



L'80%

della perdita di peso ottenuta con un palloncino Orbera della durata di 6 mesi si ottiene nei primi tre mesi¹

Riacquisterò il peso perduto?

Nessun programma per la perdita del peso corporeo è una bacchetta magica



Il programma Elipse è concepito per favorire la perdita di peso nel momento in cui decidi anche di adottare un nuovo stile di vita e nuove abitudini alimentari*

*I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento. **Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.

APM119-03



Il programma prevede anche una collaborazione con il tuo medico e il tuo nutrizionista per individuare uno stile di vita che ti permetterà di non riprendere peso**

DCO1240

RISULTATI REALI

24

“La mia esperienza con il programma Elipse è stata eccezionale, e ho continuato a perdere peso finché il palloncino non è stato espulso”


Vanessa, Belgio
ha ridotto il proprio BMI
da 33,6 a 28,5

Rev 1

Mi devo aspettare degli effetti collaterali?


Gli effetti collaterali più comuni in genere si risolvono nell'arco una settimana¹

- Potrai controllare facilmente i sintomi con i farmaci che il tuo medico ti prescriverà
- La maggior parte delle persone è in grado di riprendere le normali attività entro pochi giorni
- Uno studio clinico di 8.506 pazienti trattati con Orbera ha dimostrato che i principali effetti collaterali erano i seguenti²



1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182

2. Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015;82(3):425-438



Sfrutta al meglio il programma Elipse



26



Prima

Sfrutta al meglio il programma Elipse



Anche se il tuo medico ti guiderà attraverso l'intera procedura, desideriamo in questa sede fornirti ugualmente alcuni suggerimenti

- In alcune persone si verificano effetti collaterali dopo il posizionamento del palloncino. Gli effetti collaterali più comuni in genere si risolvono entro una settimana¹
- Potrebbe essere opportuno, in via precauzionale, rimanere a casa dal lavoro alcuni giorni dopo la procedura oppure scegliere di farsi posizionare il palloncino di venerdì, per avere davanti il fine settimana
- Chiedi la disponibilità di un familiare o di un amico nel caso tu abbia bisogno di aiuto nello svolgimento dei lavori domestici

27




Durante

Sfrutta al meglio il programma Elipse



Segui il tuo nuovo programma alimentare salutare



Utilizza la bilancia Elipse e la app per monitorare i progressi ottenuti



Collabora strettamente con il tuo nutrizionista e con il tuo medico*



Cerca di stabilire abitudini e uno stile di vita più sani, facendo regolarmente attività fisica e riducendo il consumo di alcool



Chiedi alla tua famiglia e ai tuoi amici che ti aiutino a mangiare bene e a mantenerti attivo

*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.

Dopo

Sfrutta al meglio il programma Elipse



Il tuo percorso relativo alla perdita di peso continua anche dopo che il tuo corpo avrà espulso il palloncino

- Mantieni il tuo programma alimentare salutare
- Continua a utilizzare la bilancia Elipse e la app per monitorare i progressi ottenuti
- Cerca di mantenere abitudini e uno stile di vita più sani, facendo normalmente attività fisica e riducendo il consumo di alcool
- Chiedi al tuo professionista medico-sanitario se hai bisogno di ulteriore consulenza o supporto
- Ricorda a parenti e amici che devi ancora continuare a mangiare bene e rimanere attivo





Cambiamento di vita

Vanessa, 38, Belgio

-13kg /29lbs*

- Data di posizionamento del palloncino Elipse: Gen 2017
- Da obeso con BMI 33,6 a BMI 28,5

“Essendo una poliziotta, la forma fisica per me è importante. La mia esperienza con il programma Elipse è stata eccezionale, e ho continuato a perdere peso finché il palloncino non è stato espulso*”

Paziente Elipse reale

*I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.

DCO1240

Rev 1

Testimonianze

Sii di ispirazione per gli altri: condividi le storie dei successi dei tuoi pazienti

“Prima ero talmente grosso da avere innumerevoli difficoltà motorie; c’erano dei giorni in cui non riuscivo ad uscire di casa. Adesso, sento di essere tornato di nuovo alla vita”

Michael, 67, UK, Daily Mail

“Ho ingerito la capsula senza troppe difficoltà — Ho avvertito un po’ di fastidio ma niente di più (...) Ho perso circa 63,5 centimetri e adesso sto comodamente in una taglia 16”

Kayleigh, 28, Regno Unito, Daily Mail – Spire Thames Valley Dr. Humadi

“È stato fantastico (...) Ho perso circa 8 chili in 4 settimane, ho riacquisito energia e fiducia in me stessa, indosso abiti che non portavo da 3 anni!”

Hetsie, 42 anni, UK, Channel 4

“Stavo andando dritto dritto verso l’obesità (...) Ho terminato il trattamento 6 mesi fa ma mi sento ancora sazia più rapidamente rispetto a prima. (...) Ho perso 20 chili grazie al palloncino Elipse”

Véronique, 50 anni, Francia, Femme Actuelle



The Guardian

**Femme
actuelle**

Daily Mail

ella/you

**Discovery
CHANNEL**

EL MUNDO

Paziente Elipse reale

*I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.

APM119-03

DCO1240

Cinque punti da ricordare



01

Il tuo medico deciderà se il programma Elipse è adatto a te

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr; 29(4): 1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb; 49(2): 154-160.
APM119-03



02

I palloncini gastrici non sono una bacchetta magica e richiedono prolungate variazioni del proprio stile di vita

5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec; 48:16-22.
7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
8. Genco et al. Submitted to SOARD.



03

Dopo circa 16 settimane di trattamento con Elipse, i pazienti perdono in media da 10 a 15 kg o circa il 10-15% del proprio peso corporeo totale^{da 1 a 10}

Abstract A185, presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San Francisco, United States
DCO1240



04

Ottieni un supporto multidisciplinare durante il tuo percorso relativo alla perdita di peso*

*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell'ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.



05

Scopri la sua semplicità innovativa: niente chirurgia, niente endoscopia, niente anestesia**

**In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere necessario ricorrere a tecniche endoscopiche o chirurgiche.
Rev 1

Avvia il tuo percorso relativo alla perdita di peso, Partecipa al programma Elipse